LA FACULTÉ

SEEK KNOWLEDGE

Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects copyrights-free medical documents for non-lucratif use.
Some articles are subject to the author's copyrights.
Our team does not own copyrights for some content we publish.
"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however , we are not able to contact all the authors.
If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on: facadm16@gmail.com
All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.
Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.

Thérapeutique

-Généralités :

1-psychotérapie : -psychanalyse
-thérapie cognetivo-comportementale
-thérapie de soutien
-thérapie familiale
-psychothérapie d'inspiration psychanalytique

2-psychotropes : selon DELAY

- Définition : sont des substances chimiques à tropisme psychologique (qui sont susceptible de modifier l'activité mentale)
- Classification :3 types (l'activité psychique)

a-psycholeptique (freination) :-neuroleptiques-hypnotiques-anxiolytiques

b-psychoanaleptiques (stimulation) :-antidépresseurs-thymorégulateures

c-psychodysleptique (perturbation) :-hallucinogènes (cannabis , héroïne ……)

- NB :TRT de choc :-insulinothérapie (coma hypoglycémiante)
-sismothérapie (épilepsie grd mal

I- Les psycholeptiques :

A-Neuroleptiques :

- 5 KRK
1-creation d'1 état d'indifférence psychomotrice
2- sédation des états d'excitation et d'agitation
3-réduction progressive des troubles psychotiques aigues et chroniques
4-action sous-corticale prédominante
5-production de syndromes extrapyramidaux et végétatifs
- Classification :DELAY et DENIKER
1-à action sédative (anti maniaque)
2-à action réductive des symptômes psychotique
3-à action désinhibitrice (action sur les symptômes négatifs)
- Classification chimique :4 groupes
1-phénothiazines2-butyrophénones3-thioxanthènes4-benzamides
- Indications :
1-psychoses aigues (BDA + état confusionnel)
2-psychoses chroniques (schizophrénie, PHC délire paranoïaques)
3-les phases aigues du troubles bipolaires
4-maladie de Gilles de la tourette
- Effets indesirables :
  - ✓ Neurologique :effets extrapyramidaux précoces et tardives

-dyskinésie aigues-tardives
-syn parkinsonien
-acathésie (incapacité de meintenir 1^{e} position stable)
  - ✓ Autres :

-hypotention artérielle
-effets anticholinergiques :secheresse de la bouche ,constipation….
-effets metaboliques et neuro- endocrines :gynecomastie ,galactorrhée
-allongement du QT
-cutanes et occulaire :photosensibilité ,dépôt pigmentaires
-hemato :agranulocytose
-digestif :hepatitetoxique+occlusion intestinale
-syn malin des neuroleptique(urgence)

- Contre indications :

-maladie de parkinson-sclérose en plaque

- Evaluation de l'effet :

-apres 2 mois

B-hypnotiques :propriétéssedatives (dim la vigilance,facilite l'instalation et le meintien du someil)
-Benzodiazépines : Nitrazépam et témazépam
-autre :-Imovane -zolpidem

C-anxiolytiques :medicaments qui dim la tension émotionelle

1-benzodiazépines :

- Propriétés pharmaco :en commun

-anticonvulsivante -anxiolytique –myorelaxante –hypnotique –sédative

- Pharmacocinétique :

-metabolismehepatique –élimination urinaire

- Indications :

-anxiété reactionelle –anxiété generalisée et crise d'angoisse

- Effets IIaires :

-somnolence –amnésie antégrade –effet paradoxal –dependence(>12 semaines)

- CI :

-myasthénie –insuff respiratoire grave

2-buspirone :anxiolytique non benzodiazépine

-pas de toxicomanie –risque d'insomnie

II/Les psychoanaleptiques :

A/les antidépresseurs : actifs après 2 à 3 semaines

1-les tricycliques :-clomipramine

-amitriptyline

- Mécanisme : inhibant le rattrapageprésynoptique de la noradrénaline et la sérotonine
- CI :-glaucome à angle fermé –troubles cardiaques –association IMAO
  -troubles urinaires –épilepsie
- Effets IIaires :-sècheresse de la bouche-constipation –hypotension
  -troubles de l'érection et de l'éjaculation –prise de poids

2-IMAO :ne sont pratiquement plus utilisés

-effet hypertenseur –interaction alimentaire(fromage, vein rouge)

-attention au association avec les tricycliques

3-les inhibiteurs séléctifs de recaptage de serotonine :

- Mécanisme :inhibe de façon séléctive le recaptageprésynaptique de serotonine
- CI :pas de contre indications
- Indications :-ttes les formes de dépression
  -trble panique
  -phobie sociale
  -trbles obsessionnels compulsif
  -trbles anxieux généralisé
  -l'etat de stresse post-traumatique

B/les thymoregulateurs :

1-lithium :

- Indication :-etat maniaque –prévention des récurrences bipolaires
- CI :-inssuf rénale-gsse 1 tr –hyponatremie

2-carbamazépine(tégrétol) :

- Indications :-episode maniaque –prevention de rechute de trbles bipolaires
- Effets IIaires :-somnolence-ataxie-eruption cutanées-leucopenie
- CI :-gsse +allait-trbles du ryth cardiaque-glaucome-trbles prostatique-inssufhepatique ,renale et cardiaque

3-valproate :

- Indication :-épisode maniaque-atats mixtes
- Effets IIaires :-nausées,vomissements-prise de poids-tremblement des extremités-sedation-thrombopénie